

AHORA DE VIRBAC

Itrafungol®
Itraconazol

Tranquilidad contra la dermatofitosis en gatos



Itrafungol®

- ✓ Potente antifúngico de amplio espectro.
- ✓ Solución oral con sabor a cereza.
- ✓ Con jeringa dosificadora.
- ✓ Indicado también para gatitos.

Virbac



Itraconazol

Itrafungol® (10 mg/ml de itraconazol) está indicado para el tratamiento de la dermatofitosis causada por *Microsporum canis*.

El itraconazol es un antifúngico sintético de amplio espectro derivado del triazol.

Tratamiento de la dermatofitosis

La dosis diaria es de 5 mg/kg o 0,5 ml/kg*. Administrar la solución lentamente en la boca del gato empleando la jeringa dosificadora contenida en el envase.

*En gatitos de menos de 0,5 kg, usar una jeringa de 1 ml que permita una adecuada dosificación.

Para el tratamiento de la dermatofitosis en gatos se recomienda la siguiente pauta de tratamiento.



Un frasco de 52 ml es suficiente para el tratamiento completo de un gato de 5 kg.

Consejos para prevenir zoonosis y recaídas

- ✔ Tratar a los animales afectados también con un producto tópico.
- ✔ Desinfectar el entorno, cepillos, collares, cestas, etc. Las esporas pueden ser infecciosas hasta 18 meses en el ambiente.
- ✔ Evitar el contacto entre animales enfermos, animales sanos y personas.



Microsporum canis
© Dr S. Viaud, Francia



Lámpara de Wood
© Dr S. Viaud, Francia

ITRAFUNGOL 10 mg/ml solución oral. **Composición** Itraconazol 10 mg/ml. **Indicaciones** Gatos: tratamiento de la dermatofitosis producida por *Microsporum canis*. **Contraindicaciones** No administrar a gatos con hipersensibilidad al itraconazol o alguno de los demás ingredientes, gatos con disfunciones hepáticas o renales. **Advertencias** Reducir al mínimo el riesgo de re-infección separando los gatos que están siendo tratados. Limpiar y desinfectar el ambiente con fungicidas. Se aconseja que el veterinario recorte el pelo para eliminar pelos infectados, estimular el crecimiento de nuevo pelo y acelerar la recuperación. Eliminar adecuadamente los pelos infectados y desinfectar todos los instrumentos (tijeras, superficies, trapos...). **Precauciones** No usar en gatas gestantes o en lactación. Los gatos que sufran de patologías cardíacas deben ser cuidadosamente supervisados, retirándoseles el tratamiento si su estado clínico empeorara. La dermatofitosis por *M. canis* es una enfermedad zoonótica. Llevar ropa y guantes desechables durante el tratamiento. **Reacciones adversas** Ocasionalmente salivación, vómitos, diarrea, anorexia, depresión y apatía. Estos efectos suelen ser leves y transitorios. En casos muy raros: incremento temporal de las enzimas hepáticas e ictericia. Si los signos clínicos sugieren el desarrollo de una disfunción hepática, discontinuar el tratamiento. **Interacciones** Evitar la co-administración del producto con: cefovecina, ácido tolfenámico, midazolam oral, ciclosporina, digoxina, cloranfenicol, ivermectina, metilprednisolona, antidiabéticos orales, barbitúricos, fenitoína, antiácidos, eritromicina y antagonistas del calcio. **Posología** Vía oral directamente en la boca mediante una jeringa dosificadora: 0,5 ml/kg/día o 5 mg/kg. Administrar en 3 periodos alternantes de 7 días consecutivos, cada uno de ellos con 7 días de reposo entre tratamiento y tratamiento. En gatitos < 0,5 kg, usar una jeringa de 1 ml. Administrar preferentemente en ayunas. **Sobredosificación** En la administración de 5 veces la dosis durante 6 semanas, se observaron efectos reversibles como: aspereza del pelo, disminución de la ingesta y reducción de la ganancia de peso y un ligero aumento de neutrófilos segmentados y disminución de linfocitos. Una sobredosis de 3 veces la dosis normal durante 6 semanas no produjo efectos secundarios clínicos. En sobredosis de 3 y 5 veces / 6 semanas puede haber cambios reversibles en los parámetros bioquímicos séricos indicativos de alteración hepática (aumento de la bilirrubina, ALT, ALP y AST). **Conservación** Por debajo de 25 °C. **Formato** Frasco de 52 ml. **Nº de registro** Virbac 1593 ESP. Uso veterinario. Con prescripción veterinaria. En caso de duda consulte a su veterinario.

Virbac responde

933 716 373 616 764 990
virbac.responde@virbac.es
es.virbac.com

Construyendo el futuro
de la salud animal

