

Una desparasitación **para cada estilo de vida.**

Para los caseros, para los urbanitas,
para los aventureros, para los rescatados...
para todos.



ANTIPARASITARIOS VIRBAC

PREVENDOG

EFFITIX

EFFIPRO DUO

Virbac



PERRO

PREVENDOG®

Protección durante 12 meses contra flebótomos y 6 meses contra otros parásitos

Repele flebótomos y protege frente a otros parásitos con grandes ventajas:

- Un principio activo bien conocido.
- Una innovadora matriz gris sin fragancia.
- Con la tranquilidad de un sistema de anti-estrangulamiento.



Los parásitos **externos.**

Además de las molestias que causan con su picadura, de la sangre que “roban” a nuestras mascotas y de su desagradable aspecto, algunos parásitos externos pueden transmitir graves enfermedades.

Pulgas.

Frecuentes en perros y gatos en toda España. Transmiten parásitos como la tenia *Dypilidium*. Además, pueden producir graves dermatitis alérgicas.

Garrapatas.

Más habituales en el perro. Transmiten enfermedades de la sangre (ehrlichiosis, babesiosis, borreliosis...). Como las pulgas, se hallan presentes prácticamente en todo el territorio.

Flebótomos.

Son muy peligrosos. Transmiten la terrible leishmaniosis canina (endémica en gran parte de la Península Ibérica y cada vez más extendida) que afecta a la piel, órganos internos y puede causar la muerte.

Mosquitos.

Especies de los géneros *Culex* y *Aedes* transmiten a perros y gatos la filariosis o “gusano del corazón”, enfermedad de alta incidencia en las Islas Canarias y en diversas zonas de la Península.



PERRO

EFFITIX®

Protección frente a 4 parásitos durante 4 semanas

- Effitix proporciona hasta 4 semanas de protección eficaz con una sola aplicación.
- 4 semanas libres de preocupación, para que te olvides de los parásitos y puedas disfrutar con tu mascota.





PERRO GATO

EFFIPRO

Effipro DUO pipetas



Protección frente a pulgas y garrapatas, y contra las infestaciones prolongadas de pulgas en el hogar

- Cobertura frente a las fases larvarias de la pulga durante 3 meses.
- Elimina por contacto pulgas adultas y garrapatas.
- Al romper el ciclo vital de la pulga ayuda a prevenir reinfestaciones.

Effipro pipetas y spray

Effipro protege durante 4 semanas frente a pulgas y garrapatas



- Fórmula exclusiva para una eficacia prolongada.
- Gama completa para todos los pesos.
- Excelente relación calidad-precio.
- Aplicación sencilla e intuitiva. Pipeta antigoteo.

PREVENDOG 0,636 g collar medicamentoso perros muy pequeños (0-5 kg) • PREVENDOG 1,304 g perros grandes y muy grandes (> 25 kg) COMPOSICIÓN Collar 35 cm (15,90 g): deltametrina 1,304 g. **INDICACIONES** Prevención de re-infestaciones de garrapatas (*I. ricinus*) (anti-alimentación) de las picaduras de flebotomo (*P. perniciosus*) durante 12 meses y de Cachorros de menos de 7 semanas de edad. Hipersensibilidad a la sustancia activa/excipientes. Aplicar 1 semana antes de la exposición. No ingerir. No permitir que los niños se lo pongan con el collar. En caso de exposición oral accidental o ingestión, solicitar asesoramiento. Deltametrina es tóxica para los peces y otros organismos acuáticos. No permitir que los perros se utilicen durante la lactancia. No usar con otros parasiticidas piretroides u organofosforados descoordinados, temblor, hipersalivación, vómitos, rigidez de los cuartos traseros que suelen aparecer. En raras ocasiones pueden aparecer reacciones locales de la piel (prurito, eritema, pérdida de comportamiento (por ejemplo, letargo o hiperactividad) a menudo asociado con la irritación neuromusculares (ataxia y temblor del músculo). Los síntomas disminuyen a las 48 horas de la aplicación. **Nº DE REGISTRO** PREVENDOG 0,636 g 3730 ESP. PREVENDOG 1,304 g 3728 ESP. PREVENDOG 1,304 g 3728 ESP.

EFFITIX 26,8 mg/240 mg solución spot on para perros muy pequeños (1,5-4 kg) • EFFITIX 134 mg/1.200 mg solución spot on para perros medianos (10-20 kg) • EFFITIX 268 mg/2.400 mg solución spot on para perros muy grandes (40-60 kg) COMPOSICIÓN Fipronilo: 61 mg/ml. También es necesaria la actividad repelente frente a flebotomos y/o mosquitos. **POSOLOGÍA** Usar la combinación apropiada de pipetas. La dosis mínima es de 6,7 mg fipronilo/kg pv y 61 mg/ml en 2-4 puntos. **CONTRAINDICACIONES** Hipersensibilidad a las sustancias activas o excipientes de menos de 12 semanas o de 1,5 kg. **REACCIONES ADVERSAS** Reacciones cutáneas en el caso de lamedura, hipersalivación transitoria. **PRECAUCIONES** Mantener alejado de los niños. Tratar a todos los animales del hogar. Evitar contacto con ojos y boca y el lamido. Extremadamente raras: reacciones cutáneas transitorias en el lugar de aplicación, prurito o eritema. En caso de exposición accidental, lavar al gato y acudir al veterinario. **PRECAUCIONES** Evitar el contacto con las mucosas por contacto y puede ser nocivo si se ingiere. En caso de exposición lave la zona y evite el contacto con las personas con hipersensibilidad deben evitar el contacto. Tratar por la noche para minimizar el contacto. Los perros tratados no deben bañarse en cursos de agua durante los dos días siguientes. **GESTIÓN** de 4 o 24 pipetas. Virbac, S.A. **Nº DE REGISTRO** Effitix 26,8 mg/240 mg 3098 ESP. EFFITIX 134 mg/1.200 mg 3101 ESP. EFFITIX 402 mg/3.600 mg 3102 ESP.

EFFIPRO 2,5 mg/ml solución para pulverización cutánea para perros y gatos • EFFIPRO 402 mg/2.400 mg solución spot-on para perros medianos (10-20 kg) • EFFIPRO 268 mg solución spot-on para perros grandes (20-40 kg) • EFFIPRO 50 mg solución spot-on para gatos COMPOSICIÓN Spot-on: Fipronilo (100 mg/ml), Butacato de aluminio 2,5 mg/ml. **INDICACIONES** Tratamiento de infestaciones por pulgas y garrapatas en perros y gatos. No administrar el spot-on de perros en gatos. **REACCIONES ADVERSAS** Excepcionalmente raras: reacciones cutáneas transitorias en el lugar de aplicación, prurito o eritema. Extremadamente raras: reacciones cutáneas transitorias en el lugar de aplicación, prurito o eritema. **MODO DE USO** Spot-on: aplicar directamente contra la piel y presionarla ligeramente para vaciar su contenido en 1-2 puntos a lo largo del cuello hasta humedecer todo el pelaje; en la cabeza, aplicar con la mano tras pulverizarlo sobre los ojos y la nariz. Spot-on: conservar a menos de 30°C en lugar seco. Spray: inflamable; conservar a menos de 30°C. **PRECAUCIONES** Evitar el contacto con los niños. Evitar el contacto con las mucosas por contacto y puede ser nocivo si se ingiere. En caso de exposición lave la zona y evite el contacto con las personas con hipersensibilidad deben evitar el contacto. Tratar por la noche para minimizar el contacto. Los perros tratados no deben bañarse en cursos de agua durante los dos días siguientes. **GESTIÓN** de 4 o 24 pipetas. Virbac S.A. Carros. FRANCIA. Representante: Virbac España S.A. **Nº DE REGISTRO** EFFIPRO 268 mg 2023 ESP. EFFIPRO 402 mg 2024 ESP. EFFIPRO 50 mg 2017 ESP.

EFFIPRO DUO 50 mg/60 mg spot-on gatos (1-6 kg) • EFFIPRO DUO 67 mg/20 mg spot-on para perros medianos (10-20 kg) • EFFIPRO DUO 268 mg/80 mg spot-on para perros grandes (20-40 kg) DESTINO Gatos y perros. **INDICACIONES** Infestaciones sólo de pulgas o en asociación con garrapatas (*Ctenocephalides felis*) durante 7 semanas en perros y 5 semanas en gatos. Prevención de infestaciones de pulgas adultas durante 12 semanas después de la aplicación. **Frente a las garrapatas:** Tratamiento de infestaciones de garrapatas (en perros y gatos). Eficacia acaricida en gatos durante 1 semana y en perros durante 2 semanas frente a *Dermacentor reticulatus* y *Rhipicephalus sanguineus*. Si algunas especies de garrapatas están presentes en el momento de la administración, el medicamento no evita que las garrapatas se adhieran a los animales. El medicamento no evita que las garrapatas se adhieran a los animales de enfermedades infecciosas por garrapatas no puede excluirse completamente. Se ha demostrado que las garrapatas mueren dentro de las primeras 48 horas de la aplicación. Si están presentes *Dermacentor reticulatus* o *Rhipicephalus sanguineus* no mueran dentro de las primeras 48 horas. Una vez muertas, las garrapatas se suelen desmenujar asegurando que sus piezas bucales no queden dentro de la piel. **PRECAUCIONES** Sólo uso en perros y gatos. No usar en gatos menores de 10 semanas de edad o menos de 1 kg. Evitar el contacto con los ojos y las heridas. No repetir el tratamiento a intervalos menores de 4 semanas. Puede causar neurotoxicidad si se aplica en la boca. Los animales tratados no deben manipularse hasta que el lugar de aplicación esté seco. En caso de contacto accidental con la piel, lavar con agua abundante y con jabón. Evitar el contacto con los ojos y la boca. Evitar el contacto con las mucosas por contacto y puede ser nocivo si se ingiere. En caso de exposición lave la zona y evite el contacto con las personas con hipersensibilidad deben evitar el contacto. Tratar por la noche para minimizar el contacto. Los perros tratados no deben bañarse en cursos de agua durante los dos días siguientes. **GESTIÓN** de 4 o 24 pipetas. Virbac S.A. Carros. FRANCIA. No sujeto a prescripción veterinaria. **TITULAR** Virbac S.A. Carros. FRANCIA. **Nº DE REGISTRO** EFFIPRO DUO 67 mg/20 mg 3290 ESP. EFFIPRO DUO 134 mg/40 mg 3291 ESP. EFFIPRO DUO 268 mg/80 mg 3292 ESP.

DOG 1,056 g collar medicamentoso perros pequeños y medianos (0-25 kg) • PREVENDOG
eltametrina 0,636 g. Collar 60 cm (26,40 g): deltametrina 1,056 g. Collar 75 cm (32,60 g):
s y *R. sanguineus*) por efecto acaricida durante 6 meses. Prevención por efecto repelente
mosquito (*C. pipiens*) durante 6 meses. **DOSIS** Un collar/perro. **CONTRAINDICACIONES**
ntes. No usar en gatos ni perros con lesiones en la piel. **ADVERTENCIAS/PRECAUCIONES**
en la boca. Lavarse las manos después de su colocación. Evitar el contacto prolongado
médico. Aunque el contacto ocasional con el agua no reduce la eficacia del collar, la
perros con el collar se bañen en los cursos de agua. No usar durante la gestación. Puede
os. En caso de ingesta accidental pueden aparecer síntomas de intoxicación: movimientos
en disminuir dentro de 48 horas. Contactar con el veterinario. **REACCIONES ADVERSAS**
ida del pelo) en el cuello o en la piel en general. En casos muy raros alteraciones del
ón de la piel, síntomas gastrointestinales (vómitos, diarrea e hipersalivación) y problemas
e retirar el collar. **FORMATOS** Cajas con 1 y 2 collares. **TITULAR** Vetpharma Animal Health.
NDOG 1,056 g 3729 ESP.

EFFITIX 67 mg/600 mg solución spot on para perros pequeños (4-10 kg) • EFFITIX
400 mg solución spot on para perros grandes (20-40 kg) • EFFITIX 402 mg/3.600 mg
Permetrina: 545 mg/ml. **INDICACIONES** Infestaciones por pulgas y/o garrapatas cuando
A 1 pipeta de la presentación correspondiente según peso del animal. Para perros > 60 kg
0 mg de permetrina/kg pv. En perros < 20 kg aplicar en dos puntos. En > de 20 kg aplicar
ntes. No usar en gatos ni conejos. No usar en animales enfermos o convalecientes, perros
lugar de administración (prurito, eritema) y prurito general. Hiperactividad. Vómitos. En
os. Conservar < 30 °C en embalaje original. Baños frecuentes podrían afectar la eficacia.
damente tóxico para los gatos: mantener los perros tratados alejados hasta que se seque
CONTRAINDICACIONES PARA LAS PERSONAS Puede causar neurotoxicidad e irritación de ojos, piel o
y consulte con un médico. Lavar las manos después del uso. No comer, beber o fumar. Las
ar el contacto durante 12 h. Puede afectar adversamente a los organismos acuáticos: los
EFICACIA Y LACTACIÓN Evaluar beneficio riesgo. Uso veterinario. **PRESENTACIONES** Cajas
67 mg/600 mg 3099 ESP. EFFITIX 134 mg/1.200 mg 3100 ESP. EFFITIX 268 mg/2.400 mg

EFFIPRO 67 mg solución spot-on perros pequeños (2-10 kg) • EFFIPRO 134 mg solución spot-on
402 mg solución spot-on perros muy grandes (40-60 kg) • EFFIPRO
tilhidroxianisol E320 (0,2 mg/ml), Butilhidroxitolueno E321 (0,1 mg/ml). Spray: Fipronilo
y gatos. **CONTRAINDICACIONES** Animales enfermos o convalecientes. Hipersensibilidad
animales menores de 2 meses de edad, perros de menos de 2 kg y gatos de menos de 1 kg.
ales: hipersalivación, signos neurológicos reversibles, vómitos o signos respiratorios.
alopecia. **POSOLOGÍA** Spot-on: 1 pipeta según especie y peso. Spray: 6-12 pulverizaciones
ADMINISTRACIÓN Uso cutáneo. Spot-on: una vez abierta, colocar la punta de la pipeta
largo del lomo. Spray: pulverizar a contrapelo sobre el animal a una distancia de 10-20 cm
s guantes. Dejar secar al aire. **CONSERVACIÓN** Manténgase fuera del alcance y la vista de
a menos de 30° y proteger del sol. **ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES** Evite el baño con
el contacto con los ojos del animal. Evite que el animal lama el producto y que los animales
beba o coma y evite el contacto con boca y ojos. En caso de contacto accidental lávese
después del uso. Los animales tratados no deben manipularse hasta que el pelaje o el punto
bañe en cursos de agua durante los 2 días después de la aplicación. Spray: aplicar y dejar
en); no inhalar y lavar cualquier salpicadura con jabón; mantenga a los animales tratados
y hasta que la piel esté seca. Uso durante la gestación y la lactancia: no se ha evidenciado
pecíficos en hembras gestantes y lactantes. Usar solo tras evaluación beneficio/riesgo.
cursos de agua. **PRESENTACIONES** Spray: 100, 250 y 500 ml. Spot-on: cajas con 4 ó 24
D EFFIPRO 2,5 mg/ml 2027 ESP. EFFIPRO 67 mg 2021 ESP. EFFIPRO 134 mg 2022 ESP.

EFFIPRO DUO 50 mg/60 mg solución spot-on perros pequeños (2-10 Kg) • EFFIPRO DUO 134 mg/40 mg solución spot-on perros
402 mg solución spot-on perros muy grandes (40-60 kg) COMPOSICIÓN Fipronilo 100 mg/ml y Piroproxifeno 30 mg/ml. **ESPECIES DE**
con garrapatas. **Frente a pulgas:** Tratamiento y prevención de infestaciones por pulgas
la multiplicación de las pulgas evitando que los huevos de pulga se desarrollen en pulgas
e infestaciones por garrapatas (*Ixodes ricinus* en perros y gatos y *Rhipicephalus turanicus*
nte a *Ixodes ricinus* y durante 4 semanas frente a *Dermacentor reticulatus* y *Rhipicephalus*
tración, no todas las garrapatas morirán en las 48 horas. **CONTRAINDICACIONES** No usar
nte **ADVERTENCIAS** Si el animal se tiene que bañar, mejor hacerlo antes del tratamiento.
garrapatas se enganchen a los animales. Si las condiciones son desfavorables, la transmisión
mostrado eficacia inmediata frente a *Ixodes ricinus*, las garrapatas de esta especie mueren
Rhipicephalus sanguineus en el momento de su administración, es posible que estas garrapatas
render del animal. Cualquier garrapata que aún permanezca se puede retirar con cuidado
externo. No usar en cachorros de menos de 10 semanas de vida y/o con peso inferior a 2 kg.
os ojos del animal. En caso de contacto accidental lávelos con agua. No aplicar en lesiones
toxicidad. Evitar el contacto con la piel y la boca. Evitar la ingestión incluyendo el contacto
esté seco, y no se les debe permitir a los niños que jueguen con animales tratados hasta
ua. En caso de ingestión accidental, consulte con el médico y muéstrelle el texto del envase
oras después del tratamiento. **REACCIONES ADVERSAS** Efectos cosméticos transitorios
ppecia local, prurito, eritema, decoloración de la piel) en punto de administración y prurito
gicos reversibles (hiperestesia, depresión, síntomas nerviosos), síntomas respiratorios
o el veterinario. **POSOLOGÍA** Unción dorsal puntual. Una pipeta/animal en función de su
redosificación. Conservar a temperatura inferior a 30 °C y en un lugar seco. Cajas de 4, 24
rinaria. **USO VETERINARIO. Nº DE REGISTRO** EFFIPRO DUO 50 mg/60 mg 3294 ESP.
DUO 268 mg/80 mg 3292 ESP

Una desparasitación para cada estilo de vida.



ANTIPARASITARIOS VIRBAC