



VIRBAC
EXPERTO EN
LEISHMANIOSIS



LA LEISHMANIOSIS
NO ES UN JUEGO

Virbac

LA LEISHMANIOSIS CANINA

La leishmaniosis canina es una enfermedad potencialmente mortal. Tu veterinario dispone de todas las herramientas necesarias para detectarla y prevenirla. Protege a tu perro desde ahora mismo.

LA CAUSA

La leishmaniosis es provocada por *Leishmania infantum*, un parásito microscópico que se transmite a los perros a través de la picadura de un insecto (el flebotomo o «mosca de la arena»).

Si un perro logra sobrevivir, se convertirá en un enfermo crónico que necesitará control y tratamiento de por vida.



LOS SIGNOS CLÍNICOS

Las evidencias más identificables son: pérdida de pelo, descamación de la piel, crecimiento anormal de las uñas, formación de úlceras en orejas y patas y aparición de sangre en orina y mucosas nasales.

Si tu mascota presenta alguno de estos signos, puede padecer leishmaniosis



Otros trastornos severos son inflamación de los linfonodos, anemia, insuficiencia renal, inflamación del hígado o el bazo, fiebre, atrofia muscular, artritis, vasculitis, adelgazamiento y fatiga.



***Habla con
tu veterinario***

DIAGNÓSTICO

La prevalencia de la leishmaniosis en España es muy alta. El clima mediterráneo favorece la presencia de flebotomos durante los meses cálidos.



La mayoría de los perros están expuestos a la picadura del flebotomo durante gran parte del año

Tras la infección, tu perro puede aparentar estar sano durante meses e incluso años antes de que aparezcan los primeros signos clínicos.

Para salir de dudas, tu veterinario puede confirmar si el animal está sano con una sencilla prueba. Si, por el contrario, el resultado indica la presencia del parásito, el diagnóstico se completará con pruebas adicionales.

PREVENCIÓN

Para proteger a nuestro perro de la picadura del flebotomo hay que usar antiparasitarios de acción repelente disponibles en pipetas y collares que también protegen frente a pulgas y garrapatas.

Tu veterinario te aconsejará la opción más adecuada dependiendo del riesgo de la zona en que vives y de las características de tu perro. Es posible que también te recomiende vacunarlo.

Los repelentes también ayudan a prevenir la transmisión a otros perros



TRATAMIENTO

La leishmaniosis es una enfermedad crónica que causa un gran sufrimiento a los perros y a sus dueños. Por este motivo, la prevención es la mejor estrategia.

No obstante, si el diagnóstico es positivo, existen tratamientos que aumentan las posibilidades de supervivencia y mejoran la calidad de vida de tu mascota.

La leishmaniosis se debe controlar toda la vida

Además de un intensivo tratamiento inicial, en la mayoría de casos serán necesarios largos periodos de medicación complementaria, visitas frecuentes al veterinario para un estricto seguimiento y nuevos tratamientos en caso de recaída.

LA LUCHA CONTRA LA LEISHMANIOSIS ESTÁ EN TUS MANOS

La leishmaniosis es, hoy por hoy, una enfermedad incurable y con alta afectación en todo el territorio español. Para frenar su contagio, desarrollo y propagación es muy importante que las personas al cuidado de perros tomemos conciencia de la gravedad del problema y actuemos para solucionarlo.

El diagnóstico precoz y la prevención son las armas más eficaces para proteger nuestras mascotas de esta enfermedad dolorosa y mortal.



Pide consejo a tu veterinario

Empieza a ganar la batalla a la leishmaniosis hoy

PREVENDOG®

Protección durante 5-6 meses contra flebotomos y otros parásitos

Repele flebotomos y protege frente a otros parásitos con grandes ventajas: un principio activo bien conocido en una innovadora matriz gris sin fragancia y la tranquilidad de un sistema anti-estrangulamiento.



PREVENDOG® 0,636 g collar medicamentoso perros muy pequeños (0-5 kg) • PREVENDOG® 1,056 g collar medicamentoso perros pequeños y medianos (0-25 kg) • PREVENDOG® 1,304 g collar medicamentoso perros grandes y muy grandes (> 25 kg) COMPOSICIÓN Collar 35 cm (15,90 g): deltametrina 0,636 g. Collar 60 cm (26,40 g): deltametrina 1,056 g. Collar 75 cm (32,60 g): deltametrina 1,304 g. **INDICACIONES** Prevención de re-infestaciones de garrapatas (*I. ricinus* y *R. sanguineus*) por efecto acaricida durante 6 meses. Prevención por efecto repelente (anti-alimentación) de las picaduras de flebotomo (*P. perniciosus*) durante 5 meses y de mosquito (*C. pipiens*) durante 6 meses. **DOSIS** Un collar/perro. **CONTRAINDICACIONES** Cachorros de menos de 7 semanas de edad. Hipersensibilidad a la sustancia activa/excipientes. No usar en gatos. No usar en perros con lesiones en la piel. **ADVERTENCIAS/PRECAUCIONES** Aplicar 1 semana antes de la exposición. No ingerir. No permitir que los niños se lo pongan en la boca. Lavarse las manos después de su colocación. Evitar el contacto prolongado con el collar. En caso de exposición oral accidental o ingestión, solicitar asesoramiento médico. Aunque el contacto ocasional con el agua no reduce la eficacia del collar, la deltametrina es tóxica para los peces y otros organismos acuáticos. No permitir que los perros con el collar se bañen en los cursos de agua. No usar durante la gestación. Puede utilizarse durante la lactancia. No usar con otros parasitocidas piretroides u organofosforados. En caso de ingesta accidental pueden aparecer síntomas de intoxicación: movimientos descoordinados, temblor, hipersalivación, vómitos, rigidez de los cuartos traseros que suelen disminuir dentro de 48 horas. Contactar con el veterinario. **REACCIONES ADVERSAS** En raras ocasiones pueden aparecer reacciones locales de la piel (prurito, eritema, pérdida del pelo) en el cuello o en la piel en general. En casos muy raros alteraciones del comportamiento (por ejemplo, letargo o hiperactividad) a menudo asociado con la irritación de la piel, síntomas gastrointestinales (vómitos, diarrea e hipersalivación) y problemas neuromusculares (ataxia y temblor del músculo). Los síntomas disminuyen a las 48 horas de retirar el collar. **FORMATOS** Cajas con 1 y 2 collares. **TITULAR** Vetpharma Animal Health. **REGISTRO** PREVENDOG® 0,636 g (3730 ESP). PREVENDOG® 1,304 g (3728 ESP). PREVENDOG® 1,056 g (3729 ESP).

EFFITIX®

Protección frente a 4 parásitos durante 4 semanas

Effitix proporciona hasta 4 semanas de protección eficaz con una sola aplicación. 4 semanas libres de preocupación, para que te olvides de los parásitos y puedas disfrutar con tu mascota.



EFFITIX® solución spot on para perros Composición Fipronilo: 61 mg/ml. Permetrina: 545 mg/ml. **INDICACIONES** Infestaciones por pulgas y/o garrapatas cuando también es necesaria la actividad repelente frente a flebotomos y/o mosquitos. **Posología** 1 pipeta de la presentación correspondiente según peso del animal. Para perros > 60 kg usar la combinación apropiada de pipetas. La dosis mínima es de 6,7 mg fipronilo/kg pv y 60 mg de permetrina/kg pv. En perros < 20 kg aplicar en dos puntos. En > 20 kg aplicar en 2-4 puntos. **CONTRAINDICACIONES** Hipersensibilidad a las sustancias activas o excipientes. No usar en gatos ni conejos. No usar en animales enfermos o convalecientes, perros de menos de 12 semanas o de 1,5 kg. **REACCIONES ADVERSAS** Reacciones cutáneas en el lugar de administración (prurito, eritema) y prurito general. Hiperactividad. Vómitos. En caso de lamedura, hipersalivación transitoria. **PRECAUCIONES** Mantener alejado de los niños. Conservar < 30 °C en embalaje original. Baños frecuentes podrían afectar la eficacia. Tratar a todos los animales del hogar. Evitar contacto con ojos y boca y el lavado. Extremadamente tóxico para los gatos: mantener los perros tratados alejados hasta que se seque la zona y en caso de exposición accidental, lavar al gato y acudir al veterinario. **PRECAUCIONES PARA LAS PERSONAS** Puede causar neurotoxicidad e irritación de ojos, piel o mucosas por contacto y puede ser nocivo si se ingiere. En caso de exposición lave la zona y consulte con un médico. Lavar las manos después del uso. No comer, beber o fumar. Las personas con hipersensibilidad deben evitar el contacto. Tratar por la noche para minimizar el contacto durante 12 h. Puede afectar adversamente a los organismos acuáticos: los perros tratados no deben bañarse en cursos de agua durante los dos días siguientes. **GESTACIÓN Y LACTACIÓN** Evaluar beneficio riesgo. Uso veterinario. **PRESENTACIONES** Cajas de 4 o 24 pipetas. Virbac, S.A. **Nº DE REGISTRO** Effitix 26,8 mg/240 mg solución spot on para perros muy pequeños (1,5-4 kg): 3098 ESP. Effitix 67 mg/600 mg solución spot on para perros pequeños (4-10 kg): 3099 ESP. Effitix 134 mg/1.200 mg solución spot on para perros medianos (10-20 kg): 3100 ESP. Effitix 268 mg/2.400 mg solución spot on para perros grandes (20-40 kg): 3101 ESP. Effitix 402 mg/3.600 mg solución spot on para perros muy grandes (40-60 kg): 3102 ESP.

VP901007 - Abril 2021