



DIAPROOF PRO[®] polvo oral

Pienso complementario dietético. Estabilización del equilibrio hídrico y electrolítico.
Bovino (terneros), Equino (potros), Ovino (corderos), Caprino (cabritos).

Composición: Dextrosa monohidrato*, plantago ovata* (27 %), levadura de cerveza seca* (11 %), bicarbonato sódico (7,1 %), cloruro sódico, sales sódicas del ácido cítrico (3,5 %), cloruro potásico, harina de trigo*, hidróxido de magnesio. Aditivos nutricionales (por kg). Vitaminas: 3a315 Niacinamida 8700 mg; 3a700 Vitamina E: 3000 IU. Constituyentes analíticos. Proteína bruta 9,30 %; Fibra bruta 1,10 %; Aceites y grasas brutas 0,97%; Cenizas brutas 16,97 %; Calcio 0,07 %; Sodio 4,35 %; Fósforo 0,22 %; Magnesio 0,50 %; Potasio 1,84 %; Cloruro sódico 6,97 %; Bicarbonatos 5,14 %; Citratos 2,53 %.

*fuentes de carbohidratos.

Indicaciones: Estabilización del equilibrio hídrico y electrolítico. Prevención y tratamiento de los trastornos diarreicos y en su convalecencia. Se recomienda consultar a su veterinario antes de usarlo. El periodo de utilización recomendado es de 1 a 7 días (de 1 a 3 días si constituye el alimento exclusivo del animal). El producto normalmente se mezcla con agua caliente (40 °C) pero también se puede utilizar mezclado con leche o con agua y leche. Mezclar y dar al animal rápidamente antes de que la solución gelidifique. El tiempo de preparación y administración no debe exceder de 20 minutos.

Posología y vía de administración:

Corderos y cabritos: Preparar la solución tal y como se indica a continuación.

		Agua a 40°C	Diaproof Pro [®]
Primera comida	0 h	½ litro	25 g
Segunda comida día	+12.00 h	½ litro	25 g
Tercera comida	+12.00 h	½ litro	25 g

Presentaciones: Caja de 24 sobres de 100 g y envase de 1 kg.

Precauciones: Diaproof Pro[®] no debe administrarse junto con espasmolíticos y/o otros electrolitos.

